

Over WoMan

In deze editie besteden we aandacht aan de WoMan studie, die reeds van start is gegaan.

Anders dan dat u gewend van ons bent, presenteren we deze keer slechts een lopende studie.

Een ontsteking van de klier van Bartholin, door een symptomatische cyste of abces, kan ontlast worden middels marsupialisatie of door het achterlaten van een wordkatheter. Op deze manier bestaat er een (tijdelijke) opening, zodat het ontstekingsvocht middels deze opening gedraineerd kan worden en de kans op een recidief verlaagt. Om te onderzoeken welke van deze twee behandelingen leidt tot de minste recidieven binnen een termijn van 12 maanden, wordt een RCT uitgevoerd. Tevens zal de patiënttevredenheid in deze studie worden onderzocht met aandacht voor de pijn.

Tot slot, indien u nog een studie heeft die voor de UNO in aanmerking komt neem dan contact met ons op!

Vriendelijke groeten,
Sabine Ensing en Kai Mee Wong

Sabine Ensing e s.ensing@amc.uva.nl
Kai Mee Wong e k.m.wong@amc.uva.nl

Lopende studie

WoMan

Acroniem
WOMAN

Volledige titel

Behandeling van een cyste of abces van Bartholin: wordkatheter of Marsupialisatie.

Achtergrond

Een cyste of abces van de klier van Bartholin komt regelmatig voor bij vrouwen in de fertiele levensfase. Doel van de behandeling is drainage en het creëren van een permanente opening, ter voorkoming van een recidief. Dit wordt bij voorkeur gedaan door marsupialisatie of het plaatsen van een wordkatheter. Het is onduidelijk welke behandeling de minste recidieven geeft.

Vraagstelling

Welke behandeling van een cyste of abces van Bartholin (marsupialisatie of wordkatheter) heeft de laagste recidiefkans?

Studie opzet

Multicenter randomized controlled trial.

Studie populatie

160 patiënten met een symptomatische cyste of abces van Bartholin, welke behandeling behoeft.

Interventie

Patiënten worden gerandomiseerd voor behandeling door middel van marsupialisatie of het plaatsen van een wordkatheter.

Uitkomstmaat

Primaire uitkomstmaat: Recidief binnen 1 jaar.
Secundaire uitkomstmaat: Post-operatieve pijn.

Stand van zaken

De studie startte augustus 2010 in twee centra. Momenteel loopt de studie in negentien centra (waarvan één in Engeland). Er zijn 136 patiënten geïncludeerd.

Website

www.studies-obsgyn.nl/woman